

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

40
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CLERMONT-FERRAND

(Tél. 95-10 et 97-11 Postes 260 et 263)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, HAUTE-VIENNE, PUY-DE-DOME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative d'Assas, rue Pélissier,
CLERMONT-FERRAND.

C. C. P. : CLERMONT-FERRAND 5.503-17

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

Bulletin n°6 - Mars 1961

AVERTISSEMENT

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER .-

Les premières contaminations qui ont lieu, à partir des germes de la maladie (conidies) se formant sur les pustules chancreuses provoquées par ce champignon sur les rameaux, sont souvent graves.

Dans les vergers de Poiriers où les attaques de Tavelure sont habituellement à redouter, nous conseillons d'effectuer un traitement dès que les bourgeons floraux seront éclatés (stade C3). Ce traitement est à effectuer immédiatement sur les arbres ayant atteint ou dépassé ce stade.

Dans les endroits favorables et pour les variétés sensibles à cette maladie, ce traitement est d'autant plus essentiel que les périthèces (autres organes de conservation de la maladie, pendant l'hiver) sont sur le point d'arriver à maturité.

INFORMATIONS

ARBRES FRUITIERS

ANTHONOME DU POMMIER .-

Cet insecte est actif dans certains vergers depuis le 15 février.

Si le temps se maintient favorable, des dégâts importants sont à redouter.

Nous conseillons d'intervenir dès que les Pommiers auront atteint le stade B (bourgeons laissant apparaître des bouts blancs).

Sur les arbres ayant actuellement dépassé ce stade, utiliser de préférence un produit à base d'H.C.H. ou de Lindane.

DLP 28-3-61 051438

..P.../// 7

CECIDOMYIE DES POIRETTES .-

Le début du vol vient d'être noté en cages d'élevage et dans la nature.

Ce sont les variétés à débourrement précoce qui seront les plus **fortement** contaminées. (Variétés dont les bourgeons floraux sont actuellement largement éclatés).

Dans les vergers de Poiriers, où des dégâts sont habituellement à craindre (petites poires, déformées en calebasses, contenant de nombreux vers), effectuer, par beau temps, un traitement copieux.

OIDIUM DU POMMIER .-

Nous rappelons que dans les vergers sujets à cette maladie, les traitements doivent être entrepris dès que le débourrement est bien amorcé (stade B).

Les pulvérisations devront être particulièrement soignées et abondantes.

N O T A

- Si les conditions météorologiques actuelles persistent, il faut s'attendre à des attaques précoces, pouvant être sévères (outre les parasites visés dans cette note) de Pucerons, d'Araignées rouges, de Coupe-bourgeons, de Méléthides....

- Les organes de conservation de la Tavelure du Pommier, (comme ceux du Poirier) évoluent rapidement.

- Pour les produits à utiliser, en cours d'année contre les différents Parasites (Insectes, Acariens, Maladies cryptogamiques), consulter la liste ci-jointe.

- En cas de mélange de produits, respecter les indications données par les fabricants des spécialités retenues.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles

A. LECLERC.

l'Inspecteur de la Protection
des Végétaux :

P. DENIZET.